CONCOURS D'ELEVE TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES (MAI 2006)
DURÉE : 4 HEURES

EXERCICE 1

- Calculer $(1+i\sqrt{2})^6$.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^6 - 1 = 0$.
- En déduire dans $\mathbb{C}$ les six solutions de l'équation : $z^6 = 23 - 10i\sqrt{2}$ (Les racines seront données sous la forme algébrique).

EXERCICE 2

On considère dans $\mathbb{C}$, le système d'inconnues x, y, z suivant (S) :

$$\begin{cases} x + y + z = 2i - 1 \\ xy + yz + xz = -2(1 + i) \\ x \cdot y \cdot z = 2 \end{cases}$$

- Soit le polynôme à variable complexe z défini par : $P(z) = z^3 + (1-2i)z^2 - 2(1+i)z - 2$.
Montrer que $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ est solution de (S) si et seulement si a, b et c sont racines de P .
- Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle et une seule que l'on déterminera.
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$ et en déduire les solutions du système (S) dans $\mathbb{C}^3$.

EXERCICE 3

Soit E un espace vectoriel de dimension 2. On note $L(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E , Id l'application identique de E et θ l'application nulle de E .

Pour tout élément f de E , on pose: $f \circ f = f^2$ et $f + f = 2f$.

On se propose d'étudier les éléments f de $L(E)$ tels que: $(f - Id)^2 = \theta$ (1)

- Montrer que $(f - Id)^2 = \theta$ équivaut à $2f - f^2 = Id$
En déduire que si f est solution de (1), alors f est bijectif et préciser f^{-1} .
- Quelles sont les homothéties vectorielles solutions de (1)?

b) Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de E , f et g les endomorphismes de matrices respectives

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \text{ et } M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que f et g sont solutions de (1).

En déduire qu'il existe un élément h de $L(E)$ tel que $h \neq \theta$ et $h^2 = \theta$.

- Soit f une solution de (1) et k un réel; démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{u}$ non nul tel que $f(\vec{u}) = k\vec{u}$ si, et seulement si, $k = 1$.
- Soit h un élément de $L(E)$ différent de θ tel que $h^2 = \theta$. Soit $\vec{u}_0$ un vecteur de E tel que $h(\vec{u}_0) \neq \vec{0}$.

Montrer que $(h(\vec{u}_0), \vec{u}_0)$ est une base de E . Donner la matrice de h dans cette base.

b) En déduire que, pour f solution de (1) et $f(1) = 1$, il existe une base de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f est de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

EXERCICE 4

Pour tout entier n strictement positif, on considère la fonction f_n définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f_n(x) = \frac{(\ln x)^n}{x^2}.$$

On note C_n la courbe représentative de f_n dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthogonal (unités graphiques: 2 cm sur l'axe des abscisses, 10 cm sur l'axe des ordonnées).

Partie A

- On considère $n = 1$.
 - Calculer les limites de f_1 en 0 et en $+\infty$. Que peut-on en déduire pour C_1 ?
 - Etudier les variations de f_1 et dresser son tableau de variation.
 - Déterminer une équation de la tangente à C_1 en son point d'abscisse 1.
- On considère $n = 2$.
 - Calculer les limites de f_2 en 0 et en $+\infty$. Que peut-on en déduire pour C_2 ?
 - Calculer $f_2'(x)$ et dresser le tableau des variations de f_2 .
- Etudier le signe de $f_1(x) - f_2(x)$; en déduire les positions relatives de C_1 et C_2 .
- Tracer C_1 et C_2 .

Partie B

n étant un entier naturel non nul, on pose: $I_n = \int_1^e f_n(x) dx$.

- On pose $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$; calculer $f'(x)$. En déduire I_1 .
- En utilisant une intégration par parties, montrer que: $I_{n+1} = \frac{1}{e} + (n+1)I_n$
- Calculer I_2 puis l'aire en cm^2 du domaine plan compris entre les courbes C_1 et C_2 et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.
- En utilisant la question 2. de la partie B, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, on a:
$$\frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right).$$
- En utilisant un encadrement de $\ln x$ sur $[1, e]$, montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a: $0 \leq I_n \leq 1$.
 - En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$