

Exercice 1

1) Calcul de A

$$A = \ln \ln e \sqrt{e} + \ln e^2 - \ln \frac{1}{e^3} + 2 \ln \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$= \ln \ln e^{1+\frac{1}{2}} + 2 + 3 - 2 \times \frac{1}{2}$$

$$A = \ln \frac{3}{2} + 4$$

2) Résolution des équations :

$$(E_1) \quad \begin{cases} 4e^{2x} - 9 = 0 \\ 4(e^x)^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

Posons $X = e^x$

$$4X^2 - 9 = 0$$

$$(2X-3)(2X+3) = 0 \Rightarrow X = -3/2 \text{ ou } X = 3/2, \text{ Donc } e^x = -3/2 \text{ ou } e^x = 3/2$$

Or $e^x = -3/2$ est impossible car $e^x > 0$

$$e^x = 3/2 \Rightarrow x = \ln 3/2 \text{ d'où } S = \{\ln 3/2\}$$

$$(E_2) \quad e^{2x} - 4 = -3e^x \Rightarrow (e^x)^2 + 3e^x - 4 = 0$$

Posons $X = e^x$

$$\text{On obtient, } X^2 + 3X - 4 = 0 \quad (E'_1)$$

$$\Delta = 9 + 16$$

$$= 25$$

$\Delta > 0$ Donc l'équation (E'_1) à Deux solutions X_1 et X_2

$$X_1 = \frac{-3-5}{2} = -4 \quad X_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

Donc $X = -4$ ou $X = 1$

$e^x = -4$ ou $e^x = 1$

$e^x = -4$ est impossible car $e^x > 0$ donc $e^x = 1$

$x = \ln 1 = 0$

$$S = \{0\}$$

3) a) résolutions dans $\mathbb{R}^2$ le système (S)

$$(S) = \begin{cases} 2x + y + z = 1 & (E_1) \\ x + 2y + z = 1 & (E_2) \\ x + y + 2z = 1 & (E_3) \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} (E_1) \quad \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ (-2E_2) \quad -2x - 4y - 2z = -2 \end{cases} \\ \hline \end{array}$$

$$(E_1 - E_2): -3y - z = -1 \quad (E'_2)$$

$$\begin{array}{l} (E_1) \quad \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ (-2E_3) \quad -2x - 2y - 4z = -2 \end{cases} \\ \hline \end{array}$$

$$(E_1 - E_3): -y - 3z = -1 \quad (E'_3)$$

$$\begin{array}{l} (E'_2) \quad \begin{cases} -3y - z = -1 \\ (-3E'_3) \quad 3y + 9z = 3 \end{cases} \\ \hline \end{array}$$

$$(E'_2 - 3E'_3): 8z = 2 \quad (E''_3)$$

On obtient donc le système

$$\begin{cases} 2x + y + z = 1 & (E_1) \\ -3y - z = -1 & (E'_2) \\ 8z = 2 & (E''_3) \end{cases}$$

$$(E''_3): z = \frac{1}{4}$$

$$-3y - \frac{1}{4} = -1$$

$$(E_3'') \text{ dans } (E_3') : -3y = -\frac{3}{4}$$

$$y = \frac{1}{4}$$

(E_3'') et (E_2') dans (E_1)

$$2x + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$2x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{4}$$

$$\text{Donc } S = \left\{ \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4} \right) \right\}$$

b) déduisons la résolution du système

$$\begin{cases} 2e^x + e^y + e^z = 1 \\ e^x + 2e^y + e^z = 1 \\ e^x + e^y + 2e^z = 1 \end{cases}$$

$$X = \frac{1}{4} \quad y = \frac{1}{4} \quad z = \frac{1}{4}$$

$$e^x = \frac{1}{4} \quad e^y = \frac{1}{4} \quad e^z = \frac{1}{4}$$

Posons

$$x = \ln \frac{1}{4} \quad y = \ln \frac{1}{4} \quad z = \ln \frac{1}{4}$$

$$x = -\ln 4; \quad y = -\ln 4; \quad z = \ln 4$$

$$S = \{(-\ln 4; -\ln 4; -\ln 4)\}$$

Exercice 2

1) Déterminons le nombre d'enfant qui ont cotisé

Soit x le nombre d'enfant qui ont cotisé.

Au départ, il y avait x+3 enfants, le prix du ballon est donc $200(x+3)$

A la fin, x enfant ont cotisé donc le prix du ballon est aussi $250x$

$$\text{Alors } 200(x+3) = 250x \Rightarrow 200x+600 = 250x$$

$$-50x = -600$$

$$x = 12$$

Donc 12 enfants ont cotisé.

2) Prix du ballon

Ce prix est $250x = 250 \times 12 = 3000F$

Ce prix est donc 3000F

Exercice 3

1) Nombre de tirages possibles

$$\begin{aligned} C_{32}^4 &= \frac{32!}{4! 28!} \\ &= \frac{32 \times 31 \times 30 \times 29}{4 \times 3 \times 2} \\ &= 35960 \end{aligned}$$

il y'a donc 35960 tirage possibles

2) Calcul de probabilité

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} \\ &= \frac{C_8^1 \times C_8^1 \times C_8^1 \times C_8^1}{C_{32}^4} \\ &= \frac{8 \times 8 \times 8 \times 8}{35960} = \frac{4096}{35960} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{\text{card} B}{\text{card} \Omega} \\ &= \frac{C_4^1 \times C_{28}^3}{C_{32}^4} \\ &= \frac{4 \times 3276}{3590} \end{aligned}$$

$$P(C) = \frac{C_{28}^4}{C_{32}^4}$$

Calcul de $P(D)$

1^{ère} méthode

$$P(D) = \frac{C_4^2 \times C_{28}^2 + C_4^3 \times C_{28}^1 + C_4^4}{C_{32}^4}$$

2^{ème} méthode

Soit l'évènement $\bar{D}$: « obtenir au plus 1 as »

$$\text{Alors } P(\bar{D}) = \frac{C_{28}^4 + C_4^3 \times C_{28}^1}{C_{32}^4}$$

(ou alors $P(\bar{D}) = P(B) + P(C)$)

$$P(D) = 1 - P(\bar{D})$$

{Application numérique ...}

EXERCICE 4 :

$$f(x) = \frac{2(6x^2 - x + 6)}{12x^2 + 11x - 5}$$

1) Domaine de définition de f

f existe si et seulement si

$$12x^2 + 11x - 5 \neq 0$$

$$\Delta = 11^2 - 4(12)(-5)$$

$$= 121 + 240$$

$$= 361$$

$\Delta > 0$ donc le polynôme $12x^2 + 11x - 5$ admet deux racines x_1 et x_2

$$x_1 = \frac{-11 - 19}{2(12)}$$

$$x_1 = -\frac{5}{4}$$

$$x_2 = \frac{-11 + 19}{2(12)}$$

$$x_2 = \frac{1}{3}$$

$$Df = \mathbb{R} / \left\{ \frac{1}{3}; -\frac{5}{4} \right\}$$

$$\text{Donc } Df = \left] -\infty; -\frac{5}{4} \right[\cup \left] -\frac{5}{4}; \frac{1}{3} \right[\cup \left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$$

2) Déterminons les réels a , b et c

$$f(x) = \frac{2(6x^2 - x + 6)}{12x^2 + 11x - 5} = a + \frac{b}{3x - 1} + \frac{c}{4x + 5}$$

$$\frac{a(6x-1)(4x+5)+b(4x+5)+c(3x-1)}{(3x-1)(4x+5)} = f(x)$$

$$\text{Donc } \frac{a(12x+11x-5)+b(4x+5)+c(3x-1)}{(3x-1)(4x+5)} = f(x)$$

$$\frac{(12a)x^2+(11a+4b+3c)x+(-5a+5b-c)}{12x^2+11x-5} = \frac{12x^2-2x+12}{12x^2+11x-5}$$

Par identification

$$\begin{cases} 12a = 12 & (E_1) \\ 11a + 4b + 3c = -2 & (E_2) \\ -5a + 5b - c = 12 & (E_3) \end{cases}$$

(E₁) donne a=1

$$\text{Donc } \begin{cases} a = 1 \\ 4b + 3c = -13 & (E_2) \\ 5b - c = 17 & (E_3) \end{cases}$$

(E₂+3E₃) donne b=2

A l'aide du (E₃) on a c=-7

Alors a=1 ; b=2 ; c=-7

$$\text{et } f(x) = 1 + \frac{2}{3x-1} - \frac{7}{4x+5}$$

3) Déduisons les primitives de f sur l'intervalle $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \left(1 + \frac{2}{3x-1} - \frac{7}{4x+5}\right) dx \\ &= x + \int \frac{2}{3x-1} dx - \int \frac{7}{4x+5} dx \\ &= x + \frac{2}{3} \ln|3x-1| - \frac{7}{4} \ln|4x+5| + k; (k \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont

$$F(x) = x + \frac{2}{3} \ln|3x-1| - \frac{7}{4} \ln|4x+5| + k; (k \in \mathbb{R})$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
(3x-1)	-	-	+	
4x+5	-	+	+	
3x-1	-(3x-1)	-(3x-1)	3x-1	
4x-5	-(4x+5)	(4x+5)	(4x+5)	

Les primitives de f sur $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$ sont donc :

$$F(x) = x + \frac{2}{3} \ln(3x-1) - \frac{7}{4} \ln(4x+5) + k; (k \in \mathbb{R})$$

Exercice 5 :

$$f(x) = \frac{x+1}{e^x}$$

$$Df = \mathbb{R}$$

$$=]-\infty; +\infty[$$

1) Limites aux bornes de Df

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrons que $f'(x) = -\frac{x}{e^x}$

$$f'(x) = \frac{e^x - (x+1)e^x}{e^{2x}}$$

$$\frac{-xe^x}{e^{2x}}$$

$$\text{donc } f'(x) = -\frac{x}{e^x}$$

b) sens de variation et tableau de variation de f

Sens de variation de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

Dans $]-\infty; 0[$, $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante.

Dans $]0; +\infty[$, $f'(x) < 0$, donc f est strictement décroissante.

Coordonnée des points d'intersection de la courbe avec les deux axes de coordonnées.

Avec l'axe des abscisses.

Réolvons l'équation $f(x) = 0$

$$f(x) = 0$$

$$\frac{x+1}{e^x} = 0$$

$$x+1 = 0$$


$$x = -1$$

donc: c'est le point $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Avec l'une des ordonnées $f(0) = 1$

Donc ce point est $B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

4) Tracé de la courbe (C_f)



5) Tracé de la courbe (C_g)

la courbe (C_g) de g et l'image de la courbe (C_f) de f par la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$