


DEVOIR SURVEILLE N° 1

EXERCICE 1 (4 points)

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$,

où a, b, c, d sont des réels ; sa représentation graphique est la courbe C donnée ci –contre ; les droites (d) et (d') sont des asymptotes à C. Le point A(0 ; 3) est un point de la courbe C.

Déterminer les réels a, b, c, d à l'aide du graphique. Justifier les solutions.



EXERCICE 2 (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{4x^2 + 3}$.

- Montrer que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la courbe C représentative de la fonction f .
- Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition.
- La fonction f est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?
- Déterminer les variations de la fonction f .
- Montrer que la droite d'équation $y = 2x$ est asymptote à C en $+\infty$.

EXERCICE 3 (5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{6x}{x^2 + 1}$.

- Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- Déterminer les variations de la fonction f .
- Donner une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.
- Etudier la position relative de C et de T.

EXERCICE 4 (6 points)

A . Montrer que, pour tout réel $a \in [0 ; 1]$, on a $\sqrt{a} \geq a$.

B . On s'intéresse aux fonctions f vérifiant les quatre conditions suivantes :

- la fonction f est continue sur $[0 ; 1]$;
- $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$;
- la fonction f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$;
- pour tout x de $[0 ; 1]$, $f(x) \leq x$.

a) Montrer que la fonction g définie par $g(x) = 1 - \sqrt{1-x}$ satisfait aux conditions précédentes (on pourra utiliser le résultat de la partie A).

b) En déduire que, pour tout $k \in [0 ; 1]$, l'équation $g(x) = k$ a une unique solution dans $[0 ; 1]$.

c) Résoudre cette équation lorsque $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

d) Cette fonction g est-elle dérivable en 1 ?

e) Trouver un polynôme du second degré P vérifiant les quatre conditions précédentes.

Question subsidiaire : La fonction j définie par $j(x) = 1 - \cos(\frac{\pi x}{2})$ vérifie-t-elle les quatre conditions ?